

A map of France is the background. A large, clear medical syringe is positioned diagonally across the lower half of the map. A red maple leaf is placed in the upper right quadrant. The text 'Lessons from abroad' is written in a large, black, serif font, centered over the map.

Lessons from abroad

ΜΕΙΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ:
Το ελβετικό παράδειγμα

ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

- ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ
- DRUG CHECKING




Ελβετική πολιτική

ΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΠΡΟΛΗΨΗ



ΜΕΙΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ



ΚΑΤΑΠΝΙΞΗ
ΧΡΗΣΗΣ



Αίθουσες
επιοπτευόμενης
χρήσης



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Zobel & Dubois Arber, 2004; Nadelmann et al., 1999;
Kimber 2001; MSIC Evaluation Committee, 2003; Wood,
Tyndall, Montaner, & Kerr, 2006

- Υποδοχή και ακρόαση, υποστήριξη στην καθημερινή ζωή, βοήθεια στη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την εξάρτηση, κοινωνικοποίηση.
- Συμβουλές σχετικά με την πρόληψη: υγιεινή ένεσης και τεχνικές κατανάλωσης, υπερβολική δόση, HIV / AIDS, ηπατίτιδα.
- Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ιατρικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο Quaί 9, πρώτες βοήθειες σε περίπτωση κακουχίας ή υπερβολικής δόσης, παρουσία Ψ.
- Ανταλλαγή αποστειρωμένου εξοπλισμού ένεσης για χρησιμοποιημένες σύριγγες, παροχή σετ sniff, φύλλο αλουμινίου, διττανθρακικό, προφυλακτικά και λιπαντικά, τεκμηρίωση-flyers.
- Ασφαλής περιοχή για κατανάλωση (έγχυση, εισπνοή), υπό συνεχή επίβλεψη επαγγελματία.
- Πληροφόρηση και παραπομπή σε συγκεκριμένες δομές φροντίδας και υποστήριξης (AIDS, υγεία, κοινωνική μέριμνα, εθισμός ή στέγαση).
- Μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την πορνεία (σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, ανασφάλεια, απομόνωση, βία).
- Συλλογή συριγγών και βοηθητικού εξοπλισμού.
- Δημιουργία χώρων συνάντησης μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

Θέση και αριθμός των χώρων χρήσης ουσιών στην Ευρώπη

Figure: emplacement et nombre de salles de consommation de drogues en Europe







Figure 1: Groupes de professionnels représentés dans les salles de consommation de drogues



ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Source : basé sur la figure 7 de Belackova et al, 2017.

**Να μη
συγχέουμε**



Shooting galleries

↓
Παράνομα
Ναρκωτικά

↓
Αναζήτηση
κέρδους



Αίθουσες χρήσης

↓
Παράνομα
Ναρκωτικά


↓
Νόμιμο,
υπό επιτήρηση



Πρόγραμμα χορήγησης ηρωίνης

↓
Συταγογραφούμενο
φάρμακο


↓
Ιατρική
δομή




Prescription médicale d'héroïne, 13.6.1999

moyenne suisse: **54,4% de OUI**

- 60% et plus
- de 53 à 59,9%
- de 50 à 52,9%
- de 45 à 49,9%
- moins de 45%






ΔΙΑΚΕΤΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ

- 2x πιο δραστικό από τη μορφίνη σε ισοδύναμες δόσεις λόγω των υψηλότερων λιποφιλικών ιδιοτήτων του
- πολύ ισχυρό ευφορικό αποτέλεσμα, δυναμικό παραγωγής της εξάρτησης πολύ υψηλό.
- δεν έχει καμία εγγενή οπιοειδή δραστικότητα, προφάρμακο και στον άνθρωπο μεταβολίζεται σε 6-μονοακετυλομορφίνη (6-MAM) και μορφίνη, ίδια αποτελέσματα με άλλους μ αγωνιστές
- μέση ημιζωή στο αίμα 3' μετά την ενδοφλέβια χορήγηση
- Χορηγείται σε συγκεκριμένα κέντρα μετά από αποτυχία στη θεραπεία με υποκατάστατα 1^{ης} γραμμής

Χρηματοδότηση




- Caisses Maladie
- Communes / Cantons
- Patients

Forfait hebdomadaire

Votation du
30.11. 2008

68% Oui



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- > 18 ετών
- Η προβληματική υγεία (σωματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά)
- Χρήση για περισσότερο από 2 χρόνια
- > 2 συμβατικές θεραπείες χωρίς θετικά αποτελέσματα
- Κατάθεση της άδειας οδήγησης


Συντήρηση- παραμονή στη θεραπεία

- 90 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με διαφίνη (1700 στην Ελβετία)

Από τους 55 υπάρχοντες ασθενείς:

- 8 παρακολουθούνται από το 1995 (έναρξη θεραπείας) - 15%
- 24 παρακολουθούνται >10 χρόνια - 43%
- 61% εγκαταλείπουν και επιλέγουν προγράμματα χορήγησης μεθαδόνης ή προγράμματα πλήρους αποχής


Το πρόγραμμα χορήγησης φαρμακευτικής ηρωίνης : μία ελβετική ιδιαιτερότητα



- 23 κέντρα στην Ελβετία
- Το πρόγραμμα χορήγησης φαρμακευτικής ηρωίνης στη Γενεύη είναι μοναδικό μαζί με αυτό της Λωζάνης σε όλη τη γαλλόφωνη Ελβετία




Follow-up PROVE




Follow-up PROVE

N=237




Rehm et al., 2001

Mortalité



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΟΣΗΣ DAM



Rehm et al., 2001; Gschwend et al., 2004

Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες έρευνες

- **Perneger et al., 1998** : $n = 51$, 6 μήνες, διαφίνη iv έναντι μεθαδόνης po, παρόμοια διατήρηση, διαφίνη > μεθαδόνη, χρήση ηρωίνης στο δρόμο (22% έναντι 67%), εγκληματικότητα
- **Van den Brink et al. 2003**: Δύο πολυάριθμες μελέτες, $n = 594$, διαφίνη ενέσιμη / εισπνεύσιμη έναντι μεθαδόνης po, «Responders»: 57% v. 32%, Οικονομικά αποδοτική διαφίνη
- **March et al., 2006** : $n = 62$, Ανδalousία, 9 μήνες, διαφίνη > μεθαδόνη, χρήση δρόμου, καλά αποδεκτή από τις οικογένειες
- **Oviedo-Joekes et al., 2009** : Βορειοαμερικανική πρωτοβουλία φαρμάκων για τα οπιοειδή (NAOMI), $n = 226$, δύο τοποθεσίες, ιδιαίτερα περιθωριοποιημένα θέματα, κατακράτηση DIAP > METH, Απόκριση DIAP > METH, επιπλέον βραχίονα hydromorphoneiv, αποτελέσματα παρόμοια με τα DIAP

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ



1 / 6000 injections



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γιατρός


Κοινωνικός Λειτουργός

Νοσηλευτικό προσωπικό / χορήγηση θεραπείας

5 θέσεις έγχυσης: 2 μέλη του προσωπικού
πρέπει να είναι παρόντες για κάθε περίοδο
εργασίας

> 5 θέσεις ένεσης: 3 εργαζόμενοι,
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ενός
επαγγελματία υγείας

DRUG CHECKING





Contact: drgeorgiapouliou@gmail.com